

### **Síndrome Gripal em Adultos - Indicação de Raios e Hemograma no PS**

Considerando o atendimento no HC-FAMEMA dos casos de Síndrome Gripal/ suspeita de Influenza A (H1N1), o Grupo de orientação e Cuidados a Síndrome Gripal vem **REFORÇAR**

1- É fundamental que a avaliação de gravidade dos pacientes inclua: medida da **freqüência respiratória e da saturação de oxigênio** por oximetria de pulso ou gasometria arterial. Registrar em **prontuário esta informação**.

2- O **Raio X de Tórax** deve ser realizado nos casos de Síndrome Gripal com:

- a. **Desconforto respiratório** (incapacidade de completar uma frase),
  - b. Freqüência respiratória  $\geq 30$ ipm
  - c. **SO<sub>2</sub> <92%** (pela oximetria de pulso) ou **pO<sub>2</sub><60mmHg** (gasometria arterial)
  - d. Alterações da consciência (agitação, confusão mental)
  - e. Hipotensão arterial (PA Sistólica  $\leq 90$ mmHg ou diastólica  $\leq 60$ mmHG).
  - f. Suspeita Clínica de Pneumonia

3- Em pacientes **sem critérios de internação**, sem dados ao exame físico sugestivo de Pneumonia e/ou gravidade **Não** há necessidade de se realizar **RX ou colher hemograma** para orientar a conduta .

4- As alterações que tem sido vistas no hemograma são muito variáveis e **Não** específicas da infecção por **Influenza A**.

5- Evite pedir exames desnecessariamente, como hemograma e RX de Tórax. Isto acaba por prolongar a permanência do paciente no PS, aumentando risco de transmissão para outras pessoas.